

動脈硬化度検査

● 動脈硬化度検査とは

四肢の血圧、心電図・脈波を同時に測定し、ABI（足関節血圧／上腕血圧比）とPWV（上腕～足首の脈波伝搬速度）を求めることにより、動脈の閉塞状況と硬化状況を確認することができます。




このような異常がわかります。

閉塞性動脈硬化症
動脈硬化

● 検査方法

仰向けに寝た状態で、両手両足の4カ所に血圧測定用のカフを巻きます。
手首に心電図電極を置き、
胸には心音センサを置きます。
後は安静にしてください。
検査時間は5分程度で終了します。



● 注意点



- ・妊娠中の方は測定できません。
- ・手や足にけがをしている場合は測定できません。
- ・動脈瘤のある方は測定できません。
- ・ペースメーカーを使用している方は測定できません。
- ・不整脈がある方は測定できない場合があります。
- ・身体を締め付けるような衣服を着用している場合は、測定値が正確に出ないため、脱いで頂く必要があります。
- ・血圧用カフの圧迫により気分が悪くなった場合は、すぐにお申し出ください。



一般財団法人 大阪府結核予防会
大阪病院

大阪病院は、患者さま中心のチーム医療を行い、健康を守ることで社会に奉仕します。